

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu mengenai pengaruh pemberian posisi *facilitated tucking* dan hadir berbicara terhadap skala nyeri maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Rata-rata skala nyeri bayi pada *prematum* sebelum dilakukan *facilitated tucking* dan hadir berbicara adalah nyeri berat.
- 2) Rata-rata skala nyeri bayi pada *prematum* setelah dilakukan *facilitated tucking* dan hadir berbicara adalah nyeri sedang.
- 3) Ada pengaruh pemberian posisi *facilitated tucking* dan hadir berbicara terhadap skala nyeri bayi *prematum*.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi RSUD Anutapura Palu Khususnya Ruang Peristri

Pemberian posisi *facilitated tucking* dan hadir berbicara dapat dijadikan masukan bagi para perawat sebagai tindakan untuk mengurangi nyeri bayi *prematum* saat dilakukan tindakan *diagnostik* dan prosedur *terapeutik* yang menimbulkan nyeri .

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan STIKes Widya Nusantara Palu

Disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan yang nantinya dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang pengaruh *facilitated tucking* dan hadir berbicara dalam menurunkan skala nyeri bayi *prematum* dan membantu dalam pembuatan skripsi selanjutnya.

5.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan menggunakan sampel yang lebih banyak.