

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Melakukan pengkajian pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, BBL, dan KB.

Ny"Y" umur 26 tahun, agama islam, Suku kaili, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Alamat jln bamba Tidak pernah abortus. Ibu bersalin normal dan lahir seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki. Masa nifas normal dalam keadaan baik dan ingin menjadi akseptor KB.

2. Menentukan diagnosa aktual dan masalah potensial sesuai dengan prioritas pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, BBL, dan KB.

Pada Ibu Hamil : Ny" Y" Umur 26 tahun GI PI A0 Usia Kehamilan 36 Minggu , 37 minggu, dan 38 minggu. Bayi tunggal hidup intra uteri. Pada Ibu Bersalin : Ny "Y" Umur 26 tahun PI A0 Inpartu, kala II, kala III, dan kala IV. Pada Ibu Nifas : Ny"Y" 26 tahun post partum 6 jam pertama, post partum hari ke 6, 2 minggu post partum, 6 minggu post partum. Pada Bayi:By. Ny"Y" lahir normal usia 0 hari dalam

keadaan baik. Diagnosa untuk KB : Ny”Y” Dengan akseptor KB suntik 3 bulan.

Tidak ada masalah potensial pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, BBL dan KB.

3. Merencanakan asuhan kebidanan secara kontinyu pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, BBL, dan KB.

Pada Ibu Hamil : Melakukan tes laboratorium untuk mengetahui HB, protein urine dan penyakit menular lainnya serta memberikan tablet FE. Pada saat persalinan melakukan asuhan persalinan normal 60 langkah, dan mengobservasi perdarahan dan kontraksi. Pada bayi baru lahir memastikan kehangatan bayi tetap terjaga dan mengajarkan pada Ibu tentang perawatan tali pusat. Pada masa nifas menjelaskan tentang perawatan luka perineum, perawatan payudara, dan konseling tentang tanda bahaya pada masa nifas, pada penatalaksanaan KB yaitu dilakukan konseling tentang keuntungan dan kerugian masing masing alat kontrasepsi serta efektifannya.

4. Melaksanakan dan melakukan evaluasi asuhan kebidanan secara kontinyu pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, BBL, dan KB.

Pada Ibu Hamil : Telah dilakukan tes laboratorium untuk mengetahui HB, protein urine dan penyakit menular lainnya hasilnya: HB: 13,8 gr/dl,protein urine : negative dan penyakit menular: negative, serta memberikan tablet FE 30 mg/hari. Pada Ibu bersalin dilakukan asuhan persalinan normal 60 langkah sesuai APN, dan mengobserfasi perdarahan dan kontraksi melalui pengisian partograf. Pada Bayi Baru Lahir memastikan kehangatan bayi tetap terjaga, dan Ibu mengerti tentang perawatan tali pusat. Pada masa nifas Ibu sudah bisa melakukan perawatan luka perineum dengan cara melakukan vulva hygiene, perawatan payudara, dan ibu mengerti tentang tanda bahaya pada masa nifas, pada penatalaksanaan KB yaitu Ibu mau menggunakan alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan.

5. Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ibu Bersalin, Nifas, BBL, dan KB dengan SOAP.
 - a) Melakukan pengumpulan Data Subjektif Ny “Y” 26 tahun hamil pertama dengan usia kehamilan, 36 minggu dan 37 minggu 38 minggu. Tidak pernah abortus . Ibu bersalin normal dan lahir seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki. Masa nifas normal dalam keadaan baik dan ingin menjadi akseptor KB.

- b) Melakukan pengumpulan Data Objektif Ny.' Y" 26 tahun GI PI A0 usia kehamilan, 36 minggu dan 37 minggu 38 minggu, pemeriksaan fisik normal, hasil laboratorium protein urine(-) Hb 13,8 gr/dl. Ny "Y" ditolong dengan asuhan persalinan normal terdapat ruptur perineum derajat 2, bayi dilakukan IMD, diberikan injeksi Vitamin K setelah 1 jam dan 1 jam berikutnya diberi injeksi HB0, bayi lahir dengan berat badan 2800 kg, panjang badan 51 cm, nilai abgar skor 9/10. Masa nifas Ny"Y" berlangsung dengan baik, TFU tidak teraba, lochea tidak ada dihari ke 42 dan ibu telah menggunakan KB yaitu KB suntik 3 bulan.
- c) Assesment/ analisis Pada Asuhan Kebidanan di Puskesmas Tawaeli didapatkan Data Subjektif dan Objektif sehingga ditentukan analisa ibu hamil yaitu Ny"Y" umur 26, 36 minggu, dan 37 minggu 38 minggu, janin tunggal hidup intra uteri. Pada ibu bersalin : Ny"Y" umur 26 tahun PI A0 inpartu, kala II, kala III, dan kala IV. Pada ibu nifas Ny"Y" 26 tahun post partum 6 jam pertama, post partum hari ke 6, 2 minggu post partum, 6 minggu post partum. Pada bayi: By. Ny"Y" lahir normal

usia 0 hari dalam keadaan baik. Diagnosa untuk KB :
Ny”Y” Dengan akseptor KB.

- d) Penatalaksanaan pada saat ibu hamil yaitu : lakukan tes laboratorium untuk mengetahui HB, protein urine dan penyakit menular lainnya serta memberikan tablet FE. Pada saat persalinan melakukan asuhan persalinan normal 60 langkah, dan mengobservasi perdarahan dan kontraksi. Pada bayi baru lahir memastikan kehangatan bayi tetap terjaga dan mengajarkan tentang perawatan tali pusat pada ibu. Pada masa nifas menjelaskan tentang perawatan luka perineum, perawatan payudara, dan konseling tentang tanda bahaya pada masa nifas, pada penatalaksanaan KB yaitu dilakukan konseling tentang keuntungan dan kerugian masing masing alat kontrasepsi serta efektifannya.

B. SARAN

1. Bagi Puskesmas

Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan yang menyeluruh serta mendeteksi kelainan secara dini dan mencegah terjadinya komplikasi dalam masa kehamilan.

2. Bagi institusi

Agar dapat menambah buku bahan bacaan tentang kebidanan untuk mempermudah mahasiswa dalam proses belajar dan menambah wawasan khususnya di dunia kebidanan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana secara berkesinambungan (*contiuunity of care*).