

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Madani mengenai efektivitas terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pendengaran, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Tingkat halusinasi responden sebelum diberikan terapi musik klasik bervariasi.
- 5.1.3 Tingkat halusinasi responden setelah diberikan terapi musik klasik, terjadi penurunan tingkat halusinasi.
- 6.1.3 Ada pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat halusinasi pendengaran.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi RSUD Madani Palu Khususnya Ruangan Salak dan Sirikaya

Pemberian terapi musik klasik dapat dijadikan masukan bagi para perawat minimal dilakukan 1 kali sehari dengan jangka waktu selama 15 menit kali, agar penerapan terapi musik klasik ini pada pasien yang mengalami halusinasi khususnya pada pasien dengan halusinasi pendengaran lebih ditingkatkan sehingga penerapan tindakan asuhan keperawatan lebih efektif dan efisien.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan STIKes Widya Nusantara Palu

Disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan yang nantinya dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Ilmu Keperawatan Jiwa yaitu pemberian Terapi Musik Klasik dan membantu dalam pembuatan skripsi selanjutnya.

5.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan melaksanakan penelitian nonfarmakologi lainnya misalnya *senam aerobic low impact* terhadap penurunan tingkat halusinsi