

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu mengenai Pengaruh posisi semi fowler terhadap percepatan persalinan kala II pada proses persalinan di instalasi gawat darurat RSUD Anutapura Palu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persalinan responden sebelum diberikan posisi semi fowler yaitu semua ibu bersalin mengalami lambat persalinan kala II dengan rata-rata persalinan >2 jam
2. Persalinan responden sesudah diberikan posisi semi fowler yaitu semua ibu persalinan mengalami kemajuan persalinan kala II dengan rata-rata persalinan <2 jam.
3. Ada pengaruh pemberian posisi semi fowler terhadap percepatan persalinan kala II pada proses persalinan.

#### **5.2 Saran**

##### **1. Bagi RSUD Anutapura Palu Khususnya Ruangan Instalasi Gawat Darurat Dan Kamar Bersalin**

Pemberian posisi semi fowler pada persalinan kala II dapat dijadikan masukan untuk keperawatan maternitas dalam berkolaborasi dengan para bidan, agar penerapan posisi semi fowler ini pada proses persalinan yang mengalami kesulitan kala II lebih ditingkatkan sehingga penerapan tindakan asuhan kebidanan lebih efektif dan efisien. Dan juga dapat sebagai masukan untuk keperawatan maternitas bagi RSUD Anutapura Palu

## **2. Bagi Institusi Pendidikan STIKes Widya Nusantara Palu**

Disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dipergustakaan yang nantinya dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang persalinan kala II yaitu pengaruh posisi semi fowler terhadap percepatan persalinan kala II pada proses persalinan dan membantu dalam pembuatan skripsi selanjutnya.

## **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan melaksanakan penelitian dengan posisi lainnya misalnya perbedaan posisi miring kiri dan posisi jongkok yang dapat mempengaruhi posisi persalinan kala II.